

April 2023

Geachte collega,

Het Informatorium wordt dagelijks geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank in de maand maart.

## Nieuwe stoffen

Er zijn twee nieuwe stofmonografieën opgenomen.

- Solriamfetol, een psychostimulans dat de mate van wakker-zijn verbetert en de overmatige slaperigheid overdag vermindert bij narcolepsie (met of zonder kataplexie) en bij obstructief slaapapneu OSA).
- Tabelecleucel, een allogene Epstein-Barr-virus (EBV)-specifieke T-cel immunotherapie die gericht is tegen EBV-positieve cellen en wordt toegepast bij gerecidiveerde of refractaire Epstein-Barr-virus-positieve post-transplantatie lymfoproliferatieve ziekte (EBV+ PTLD).

## Nieuwe (sub)groep P-gp-remmers

P-glycoproteïne (P-gp) is een transporteiwit dat zich bevindt in de membranen van verschillende lichaamscellen, zoals de darmcellen en de tubuliscellen. Het werkt als effluxpomp uit deze cellen. P-gp-remmers remmen het transport van substraten die (voornamelijk) via P-gp worden getransporteerd.

Onder de krachtige P-gp-remmers vallen amiodaron, ciclosporine, erytromycine, itraconazol, ketoconazol, kinidine, verapamil en ritonavir.

Deze nieuwe subgroep valt in het Informatorium onder de groep Interactielijsten. Deze groep bevat al de subgroepen CYP1A2-remmers, CYP2D6-remmers, CYP3A4-remmers, CYP3A4-inductoren en QTc-verlengers.

## Herziening hoofdstukken

Het hoofdstuk Hypofyse- en hypothalamushormonen is nu volledig herzien. Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen met de volgende belangrijke subgroepen en stoffen.

- Hypofysehormonen  
Tot deze groep behoren de gonadotrope hormonen. Deze middelen worden onder andere toegepast voor ovulatie-inductie, bij gecontroleerde ovariële hyperstimulatie en bij hypogonadotroop hypogonadisme bij mannen. Somatropine en somatrogon worden vooral gebruikt bij groeistoornissen bij kinderen. Desmopressine wordt als antidiureticum toegepast bij diabetes insipidus en enuresis nocturna, en als hemostaticum bij hemofilie A en de ziekte van Von Willebrand. Terlipressine wordt evenals het hypothalamushormoon octreotide ingezet bij bloedende oesofagusvarices.
- Hypothalamushormonen  
Tot deze groep behoren zowel de gonadoreline-agonisten als de gonadoreline-antagonisten. Deze middelen worden toegepast bij gecontroleerde ovariële hyperstimulatie bij conceptie-hulptechnieken in combinatie met de gonadotrope hypofysehormonen. Andere belangrijke toepassingsgebieden van de gonadoreline-agonisten zijn endometriose en uterusmyomen, pubertas praecox, en mammacarcinoom en prostaatcarcinoom.  
De somatostatine-analogen lanreotide, octreotide en pasireotide hebben als belangrijke toepassing acromegalie. Ook het hypofysehormoon pegvisomant wordt hierbij toegepast. Een andere belangrijke toepassing van octreotide is symptoombestrijding bij carcinoïden en andere tumoren van het maagdarmkanaal.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail [gic@knmp.nl](mailto:gic@knmp.nl).

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum