

# IM-UPDATE



November 2023

Geachte collega,

Het Informatorium wordt dagelijks geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank in de maand oktober.

## Nieuwe stoffen

Er zijn 3 nieuwe stofmonografieën opgenomen.

- Bibrocathol, een huidmiddel met een antiseptische, adstringerende en secretieremmende werking voor oculaire toepassing bij chronische blefaritis, waarvoor geen antibacteriële behandeling nodig is.
- Ivosidenib, een oncolyticum voor orale toepassing bij acute myeloïde leukemie (AML) of cholangiocarcinoom met een R132-mutatie in isocitraatdehydrogenase-1, bij AML in combinatie met azacitidine.
- Pyridoxaalfosfaat, een metaboliet van pyridoxine die oraal wordt toegepast bij pyridoxine-afhankelijke epilepsie bij kinderen.

## Nieuwe producten

De afgelopen maanden zijn verschillende nieuwe producten met een andere samenstelling of een nieuwe farmaceutische vorm beschikbaar gekomen:

- Axhidrox<sup>®</sup>, een crème met glycopyrronium voor primaire hyperhidrose.
- Bijuva<sup>®</sup>, een capsule met een combinatie van estradiol en progesteron voor hormoonsubstitutie therapie bij vrouwen vanaf 1 jaar na de menopauze.
- Budenofalk<sup>®</sup>, een zetpil met budesonide voor colitis ulcerosa gelokaliseerd in het rectum.
- Emylif<sup>®</sup>, een orodispergeerbare film met riluzol voor amyotrofe laterale sclerose (ALS).
- Orgovyx<sup>®</sup>, een tablet met relugolix voor gevorderd hormoongevoelig prostaatcarcinoom.
- Rennie<sup>®</sup>, een kauwgom met calciumcarbonaat voor dyspepsie en gastro-oesofageale reflux.
- Vizarsin<sup>®</sup>, een orodispergeerbare tablet met sildenafil voor erectiestoornis.

## Gewijzigde dosering IJzerzouten

De rubriek Dosering van de orale ijzerzouten Ferrofumaraat, Ferrochloride en Ferrosulfaat is herzien. In de SmPC's van Ferrofumaraat is de driemaal daagse dosering voor volwassenen gewijzigd in een dosis elke 2 dagen of 2-3 x per week. Dit is in lijn met de NHG-Standaard Anemie waarin al langer een intermitterende toediening van 2x per week wordt geadviseerd. Ook bij kinderen lijken een lagere en minder frequente dosering te zorgen voor een betere ijzeropname in de darm en minder bijwerkingen. De aangepaste doseeradviezen in het Kinderformularium zijn verwerkt in het IM.

## COVID-19-vaccin

De stofmonografie van COVID-19-vaccin is volledig herzien aan de hand van de geactualiseerde SmPC's en LCI-richtlijn COVID-19-vaccinatie. Op 2 oktober is de COVID-19-najaarscampagne 2023 gestart. Er wordt gebruik gemaakt van het aangepaste mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty<sup>®</sup>) tegen de omikronvariant XBB.1.5. Voor personen die geen mRNA-vaccin mogen of willen, komt naar verwachting dit najaar een op de XBB.1.5-variant aangepast coronavaccin van Novavax (Nuvaxovid<sup>®</sup>) beschikbaar. Eerder zijn ook de vaccins Spikevax<sup>®</sup> (Moderna), Vaxzevria<sup>®</sup> (AstraZeneca) en Jcovden<sup>®</sup> (Janssen) gebruikt. Deze vaccins zijn niet langer beschikbaar in het COVID-19-vaccinatieprogramma en de informatie over deze vaccins is uit de monografie verwijderd.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail [gic@knmp.nl](mailto:gic@knmp.nl).

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum