

IM-UPDATE



Mei 2024

Geachte collega,

Het Informatorium wordt dagelijks geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank in de maand april.

Nieuwe stoffen

Er zijn 5 nieuwe stofmonografieën opgenomen.

- Bulevirtide, een antiviraal middel dat subcutaan wordt toegepast bij chronische hepatitis delta (HDV) bij HDV-RNA-positieve patiënten met gecompenseerde leverziekte, als monotherapie of in combinatie met een nucleoside/nucleotide-analoog (zoals tenofovir disoproxil of -alafenamide, of entecavir) vanwege co-infectie met HBV. Hepatitis D komt namelijk alleen voor als iemand ook hepatitis B heeft.
- Cedazuridine, een hulpstof die de biologische beschikbaarheid van oraal toegediend decitabine verhoogt door remming van het enzym cytidinedeaminase (CDA) in de darmen en de lever. Het wordt in een oraal combinatiepreparaat met decitabine toegepast bij acute myeloïde leukemie (AML) die niet in aanmerking komt voor standaard inductiechemotherapie.
- Gefapixant, een hoestmiddel en selectieve antagonist van de P2X3-receptor die oraal wordt toegepast bij refractaire of onverklaarde chronische hoest.
- Lutetium Lu-177 PSMA I&T, een radiofarmacon dat wordt toegepast bij prostaat specifiek membraanantigeen positief gemetastaseerd castratieresistent prostaatacarcinoom (PSMA-positief mCRPC) na eerdere behandeling met anti-androgenen en een taxaan.
- Lutetium Lu-177 vipivotide tetraxetaan, een radiofarmacon dat wordt toegepast bij prostaat specifiek membraanantigeen positief gemetastaseerd castratieresistent prostaatacarcinoom (PSMA-positief mCRPC) na eerdere behandeling met anti-androgenen en een taxaan, in combinatie met androgeendeprivatietherapie, al dan niet gecombineerd met een androgeenreceptor pathway-inhibitor.

Malariaprofylaxe en -behandeling

Kortgeleden is het protocol voor behandeling en profylaxe van malaria van het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering) herzien. Belangrijke wijzigingen die zijn verwerkt:

- Proguanil wordt niet langer aanbevolen voor malariaprofylaxe als monotherapie of in combinatie met chloroquine. Proguanil wordt alleen nog voor profylaxe aanbevolen in combinatie met atovaquon.
- Kinine wordt niet langer geadviseerd als noodbehandeling in combinatie met doxycycline. Voor noodbehandeling worden alleen nog de combinaties atovaquon-proguanil en artemether-lumefantrine geadviseerd.
- De combinatie van atovaquon en proguanil kan worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail gic@knmp.nl.

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum