

Geachte collega,

Hierbij weer een overzicht van de wijzigingen van het G-Standaardbestand van mei 2017. Deze maand zijn er wijzigingen op de volgende gebieden:

- [Interacties](#)
- [Contra-indicaties aandoeningen](#)
- [Verminderde nierfunctie](#)
- [Kinderwens, zwangerschap, borstvoeding](#)
- [Doseringen](#)
- [GPK-/PRK-wijzigingen zonder wijziging GPK- en PRK-code](#)

## INTERACTIES

Onlangs heeft de Werkgroep Interacties oncologische middelen vergaderd. De interacties worden geleidelijk verwerkt in het bestand. Naar aanleiding van deze vergadering zijn deze maand 3 nieuwe interacties opgenomen en 10 interacties herzien. 2 interacties zijn vervallen.

Zie voor meer informatie over de beoordeling en onderbouwing de bijbehorende risicoanalyses op de KNMP Kennisbank.

### Nieuw

Ja/Nee

Interactiecode	Omschrijving
13463	Rosuvastatine + osimertinib
13471	Regorafenib + neomycine oraal

Nee/Nee

Interactiecode	Omschrijving
13455	Simvastatine + osimertinib

### Herzien

Wijziging koppelingen en/of naam interactie en/of advies

Interactiecode	Omschrijving	Wijziging
8540	Cumarines + overige nibben/ idelalisib/palbociclib	Gekoppeld: palbociclib
8532	Cumarines + mabben (bij kanker)	Gekoppeld: necitumumab, olaratumab, elotuzumab
8214	Cumarines + Oncologische middelen (cytostatisch)	Gekoppeld: trifluridine
5002	Nibben + CYP3A4-remmers (actie Nee)	Gekoppeld: osimertinib
9644	Nibben + Inductoren	Was 'Nibben + rifampicine' Gekoppeld: inductoren (bosentan, carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, primidon, rifabutine, rifampicine); en gefitinib, lapatinib en pazopanib (liepen via interactie 9652)
2828	Vaccins levend + Immunosuppressiva/Corticosteroiden.	Gekoppeld: baricitinib, tofacitinib
13048	Vaccins niet-levend + Immunosuppressiva/Corticost.	Gekoppeld: baricitinib, tofacitinib
7285	Irinotecan + Inductoren	Gekoppeld: efavirenz, etavirine, nevirapine (liep via interactie 10162)
9636	Imatinib + Inductoren	Gekoppeld: efavirenz, etavirine, nevirapine (liep via interactie 10162)

8982	Everolimus + Inductoren (was + rifampicine)	Gekoppeld: carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, rifabutine.
------	---	--

### Vervallen

Interactiecode	Omschrijving	Wijziging
9652	Gefi/Lapa/Pazopanib + Inductoren	Bewaking voortaan via interactie 9644
10162	Gefi/Ima/Lapa/Pazopanib/Irino + Efa/Etra/Nevi	Bewaking voortaan via interactie 9644 (gefi/lapa/pazopanib), 9636 (imatinib) en 7285 (irinotecan)

### Bijzonder Kenmerk Interacties nog niet beoordeeld\*

Itemnummer	Omschrijving	Koppelingen
104	Interacties nog niet beoordeeld	Gekoppeld: - tofacitinib

### CONTRA-INDICATIES AANDOENINGEN

Voor de contra-indicatie **Leverfunctiestoornis** is een advies opgenomen om apothekers te ondersteunen bij het invoeren van medicatiebewaking op de nieuwe contra-indicatie **Levercirrose**. Aan dit advies zijn alle geneesmiddelen gekoppeld die ook zijn gekoppeld aan contra-indicatie Levercirrose.

De naam van de contra-indicatie **Ulcus pepticum**: clopidogrel/prasugrel is gewijzigd in Ulcus pepticum: P2Y12-remmers. Ticagrelor is naar analogie toegevoegd.

In thesaurus 40 zijn de namen van twee contra-indicatieaarden gewijzigd:

118 – LEVERFUNCTIESTOORNIS is gewijzigd in (VERVALT PER 1-5-2018) LEVERFUNCTIESTOORNIS

1351 – LEVERCIRROSE GEDECOMPENSEERD is gewijzigd in (VERVALT PER 1-5-2018)LEVERCIRROSE GEDECOMPENSEERD.

Zie voor meer informatie over de beoordeling en onderbouwing de bijbehorende risicoanalyses op de KNMP Kennisbank.

### Nieuw

Ja/ja

Bewakingscode	Omschrijving
6418	Leverfunctiestoornis: geneesmiddelen levercirrose

### Herzien

Wijziging koppelingen en naam contra-indicatie

Bewakingscode	Omschrijving	Wijziging
23	Ulcus pepticum: P2Y12-remmers	Was 'Ulcus pepticum: clopidogrel/prasugrel' Gekoppeld: ticagrelor

### Bijzonder Kenmerk Contra-indicaties nog niet beoordeeld\*

Itemnummer	Omschrijving	Koppelingen
105	Contra-indicaties nog niet beoordeeld	Gekoppeld: - tofacitinib - indigokarmijn

## VERMINDERDE NIERFUNCTIE

### Bewaking Nog niet beoordeeld op nierfunctie\*

Bewakingscode	Omschrijving	Koppelingen
4555	Nog niet beoordeeld op nierfunctie	Gekoppeld: - tofacitinib

## KINDERWENS, ZWANGERSCHAP, BORSTVOEDING

Voor de groep Sympathicolytica –  $\alpha$ -Blokkers zijn de bewakingsteksten herzien.

### Herzien

Blijft ja/ja

Bewakingscode				Omschrijving	Wijziging
KWv	ZW	BV	KWm		
3167	3168	3169		doxazosine	Adviestekst geheel herzien
3171	3172	3173		fentolamine	Adviestekst geheel herzien
3179	3180	3181		tamsulosine	Adviestekst geheel herzien
3183	3184	3185		terazosine	Adviestekst geheel herzien
3187	2443	2444		urapidil	Adviestekst geheel herzien

KWv = Kinderwens vrouw; ZW = Zwangerschap; BV = Borstvoeding; KWm = Kinderwens man

Van ja/ja naar nee/nee

Bewakingscode				Omschrijving	Wijziging
KWv	ZW	BV	KWm		
			3170	doxazosine	Adviestekst geheel herzien
			3182	tamsulosine	Adviestekst geheel herzien
			3186	terazosine	Adviestekst geheel herzien
			3188	urapidil	Adviestekst geheel herzien

KWv = Kinderwens vrouw; ZW = Zwangerschap; BV = Borstvoeding; KWm = Kinderwens man

### Bewaking Nog niet beoordeeld op Kinderwens, zwangerschap, borstvoeding\*

Bewakingscode				Omschrijving	Koppelingen
KWv	ZW	BV	KWm		
4869	4870	4724	4725	Niet beoordeeld	Gekoppeld: - indigokarmijn - tofacitinib

KWv = Kinderwens vrouw; ZW = Zwangerschap; BV = Borstvoeding; KWm = Kinderwens man

## DOSERINGEN

Onderstaande doseringen zijn gewijzigd.

GPK	GPK-naam	Wijziging
54577	Aciclovir creme 50mg/g	Volwassenendosering toegevoegd. Deze is obsoleet, maar toch opgenomen aangezien de kinderdosering ook is opgenomen o.b.v. het NKFK.
5886, 71498, 169013	Amiodaron capsule 100mg; tablet 100mg, 200mg	Naar aanleiding van een CMR melding is 3x per dag 200mg aangepast naar 3x per dag 133,333 mg (dagdosis van 400mg) om te voorkomen dat oplaaddosering te lang wordt doorgebruikt.

53848, 53856	Amoxicilline/clavulaanzuur injpdr 500/100mg en 1000/200mg	4-6x per dag toegevoegd aan Qalg,int zorg. Bron: IM 2017.
115355	Arseentrioxide infopl conc 1mg/ml	5x per week toegevoegd. Bron IM 2017.
149241, 149268, 149276	Azitromycine susp oraal 40mg/ml; tablet 250mg, 500mg	Kinderdosering A78 (Andere infectieziekte(n)) verwijderd. Niet in NKFK 2017.
23086, 23094, 42188, 100250, 147281	Codeine drank 1mg/ml (in mixtura resolvens); stroop 0,5mg/ml; tablet 10mg (fosfaat), 15mg (fosfaat), 20 mg (fosfaat)	Dosering aangepast. Bron IM/NKFK 2017
132926	Cyanocobalamine tablet 1000ug	Absoluut maximum toegevoegd aan eenmaal daagse dosering. Bron IM 2017.
131644, 131652	Degarelix pdr v injvlst (80mg en 120mg)	Correctie dosering (was ingevoerd per m2 i.p.v. als vaste dosering).
85464	Dextromethorfan capsule mga 29,5mg	Dosering aangepast. Bron IM/NKFK 2017
22276, 22284, 117439, 129453, 129461, 151696	Diclofenac-kalium tablet omhuld 12,5mg, 25mg, 50mg; diclofenac- natrium susp oraal 5mg/ml; diclofenac-natrium tablet msr 25mg, 50mg	L03 (acute lage rugpijn) aangepast. Bron IM 2017.
22292, 40258, 40266, 56766, 161527, 168157	Diclofenac-natrium zetpil 6,25mg, 10mg, 12,5mg, 25mg, 50mg, 100mg	Q-algemeen aangepast. Bron IM 2017.
69159, 74179, 103896	Domperidon smelttablet 10mg, susp oraal 1mg/ml, tablet 10mg	ICPC A25 (angst voor de dood) verwijderd.
9652, 128945, 136050, 164852	Hydroxycarbamide capsule (100mg en 500mg) en tablet (100mg en 1000mg)	Dosering 4x per dag toegevoegd. Bron: IM 2017.
132, 13218, 42080, 50423, 50997, 51004, 81159, 99252, 101508, 112755, 116688, 117544, 164372, 164925	Ibuprofen bruisgranulaat 400mg, 600mg; capsule zacht 200mg, 400mg; dragee 200mg, 400mg; granulaat 400mg, 600mg; kauwcapsule 100mg; smelttablet 200mg; susp oraal 20mg/ml; tablet 200mg, 400mg, 600mg	L03 (specifieke lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom) verwijderd. Bron IM 2017.
125679	Ibuprofen injvlst 5mg/ml	Gewichtsbovengrens opgenomen om aan te geven dat het om premature neonaten gaat. Bron NKFK 2017.
130818, 130826, 139637	Lacosamide stroop 10mg/ml; tablet 50mg en 150mg	Dosering aangepast. Bron IM 2017
130850	Lacosamide infvlst 10mg/ml	Dosering aangepast. Bron IM 2017

47996, 109568, 153133, 168440, 168505, 168513	Methotrexaat infop conc 100mg/ml; injvlst 2,5mg/ml, 20mg/ml, 25mg/ml, 50mg/ml, 100mg/ml	Dosering aangepast. Bron IM/NKFK 2017.
165441	NaCl/MgSO4/KCl inf 9/1,5/1,49mg/ml (hydrat)	Dosering gecorrigeerd. Bij deze dosering waren de frequenties 4x per dag en 1x per 6 uur opgenomen, omdat het normmaximum bij de juiste frequentie (1x per dag) hoger werd dan 999. Inmiddels zijn maxima hoger dan 999 mogelijk in het doseringsbestand en is de juiste doseerfrequentie opgenomen.
17922, 43362, 51223, 83143, 83151, 86444, 103683	Naproxen tablet 250mg, 500mg; tablet msr 250mg, 500mg; naproxen-natrium tablet 275mg, 550mg; naproxen-natrium tablet omhuld 220mg	L02 (aspecifieke lagerugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom) verwijderd. Bron IM 2017.
10391, 54100	Naproxen zetpil 250mg, 500mg	L02 (aspecifieke lagerugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom) verwijderd. Bron IM 2017.
89648	Nicardipine infopl conc 1mg/ml	Dosering aangepast. Bron IM/NKFK 2017
124958, 124966, 124974, 159735, 159743	Nitisinon capsule (2mg, 5mg, 10mg en 20mg) en susp oraal 4mg/ml	Dosering aangepast. Bron IM/NKFK 2017
15695, 15709, 93467, 102172, 145890	Nitrofurantoin capsule 50mg, 100mg; capsule mga 100mg; susp oraal 5mg/ml, 10mg/ml	Dosering aangepast. Bron IM/NKFK 2017
157589	Ofloxacin oordruppels 3mg/ml	Kinderdosering aangepast. Bron NKFK 2017
82570	Ofloxacin oogdruppels 3mg/ml	Kinderdosering auriculair aangepast. Bron NKFK 2017
82589	Ofloxacin oogzalf 3mg/g	Kinderdosering toegevoegd. Bron NKFK 2017
116076, 116084	Ofloxacin tablet fo 200mg, 400mg	Dosering aangepast. Bron IM/NKFK 2017
111430, 111449, 111457, 111465, 115932, 116882, 116890, 116904, 118648, 134244, 134252, 134260, 134279, 134317, 134333, 134368, 139742, 139750	Oxycodon (capsule 5, 10 en 20mg; drank 10mg/ml; smelttablet 5, 10 en 20mg; tablet 5 en 10mg; tablet mg 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120mg)	A01 toegevoegd aan Qalg.

2194, 9504, 30392, 46434, 84131, 124354, 124370, 125822, 140767, 142174	Paracetamol bruistablet 1000mg; drank 24mg/ml; granulaat 500mg; kauwtablet 120mg; smelttablet 250mg, 500mg; stroop 24mg/ml; tablet 100mg, 500mg, 1000mg	L03 (aspecifieke lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom) verwijderd. A03 (pijn en koorts) aangepast. Bron IM 2017
97845, 105457, 164305	Valaciclovir drank 20mg/ml; tablet 250mg, 500mg	Dosering aangepast. Bron IM/NKFK 2017

### GPK-/PRK-WIJZIGINGEN zonder wijziging GPK- en PRK- code

Naar aanleiding van een gebruikersvraag zijn onderstaande GPK-en PRK-naam gewijzigd. Zo is duidelijker dat de sterkte van de HPK onder deze GPK en PRK slaat op de zoutvorm, coffeëncitraat.

GPK	GPK-naam oud	GPK-naam nieuw	PRK	PRK-naam oud	PRK-naam nieuw
139017	COFFEINE OPL PAREN/ORAAAL 20MG/ML (CITRAAT)	COFFEINE CITRAAT OPL PAREN/ORAAAL 20MG/ML	101079	COFFEINE OPL PAREN/ORAAAL 20MG/ML AMP 1ML (CITRAAT)	COFFEINE CITRAAT OPL PAREN/ORAAAL 20MG/ML AMP 1ML

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 3737377 (van 10:30 tot 17:00 uur) of e-mail [gic@knmp.nl](mailto:gic@knmp.nl).

#### \* Bijzonder Kenmerk en Bewaking nog niet beoordeeld

Nieuwe geneesmiddelen waarbij de medicatiebewaking nog niet volledig is, zijn herkenbaar gemaakt in de G-Standaard. Dit op verzoek van zorgverleners, die zich hier niet altijd van bewust zijn. Interacties en contra-indicaties zijn herkenbaar gemaakt met een bijzonder kenmerk. Voor verminderde nierfunctie, kinderwens, zwangerschap, borstvoeding, en verkeersdeelname is er een aparte bewaking. Het kenmerk/de bewaking is tijdelijk en wordt verwijderd als het middel is beoordeeld.