

Onderdrukken van medicatiebewakingssignalen bij TU en VU

Tabel 1. Criteria voor invullen EU/TU/VU vlaggen, voor uitzonderingen zie tabel 2.

	Soort advies	Tonen bij EU	Tonen bij TU	Tonen bij VU	Opmerkingen
1	Gebruik gecontraïndiceerd/ontraden, , ook als er escape is 'als toch wordt afgeleverd'	Ja	Ja	Ja	Voorbeelden : hiv-interacties retinoïden + tetracyclines CI Lang QT interval syndroom
2	Informatie aan patiënt geven	Ja	Ja	Nee	Tenzij: - VU=ja bij informatie over ernstige bijwerking die ook later kan ontstaan ** - TU=nee bij bijwerking die alleen bij eerste paar doses optreden
3	Informatie aan arts/overleggen met arts: - dosisverlaging - monitoren effect/spiegel	Ja	JA of NEE *)	Nee	
4	Combinatie van 1 t/m 3	Ja	'zwaarste' vlag laten gelden	'zwaarste' vlag laten gelden	Voorbeeld: gebruik gecontraïndiceerd, indien geen alternatief mogelijk: monitoren

*) december 2010: momenteel is de discussie hierover nog niet afgerond

** voorbeeld: antipsychoticum + inductor, omdat inductie tijd nodig heeft en de verlaging van de spiegel van het antipsychoticum met als mogelijk gevolg een psychose, later kan ontstaan

Tabel 2. Bijzondere situaties

	Tonen bij EU	Tonen bij TU	Tonen bij VU	Reden
"let op effectiviteit hiv-middel"	Ja	Ja	Ja	
"anticonceptie gebruiken t/m 3 mnd na staken"	Ja	Ja	Ja	IA 4642
overweeg maagprotectie	Ja	Nee	Nee	
Zwangerschap	Ja	Ja	Ja	Het schadelijke effect van het geneesmiddel varieert gedurende de zwangerschap
Kinderwens vrouw en man	Ja	Ja	Ja	Signaal is van belang bij zwangerschap, en kindwens kan altijd overgaan in zwangerschap
Verminderde nierfunctie	Ja	Ja	Ja	De nierfunctie kan wijzigen in de tijd, de adviezen zijn toegespitst op verschillende gradaties van nierfunctiestoornis.
Sportbeoefening	Ja	Ja	Ja	Voor de zekerheid altijd tonen
Verkeersdeelname	Ja	Ja	Nee	De adviezen variëren van 'een paar dagen niet autorijden' tot 'helemaal niet autorijden'. Bij TU is het nuttig te vragen naar de bijwerkingen, daarna hoeft het signaal niet meer gezien te worden.