

Geachte collega,

Het Informatorium wordt elke 2 weken geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank van juli 2018. De inhoud van de uitgave van 1 juli is op 29 juni 2018 afgerond. Het betreft wijzigingen ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 juni 2018.

### Nieuwe stoffen

Sinds de vorige uitgave is 1 nieuwe stofmonografie opgenomen.

- Gemtuzumab ozogamicine, een oncolyticum dat wordt toegepast bij 'de novo' - CD33-positieve acute myeloïde leukemie. Het is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium onder de naam gemtuzumab.

### Nieuwe producten

Sinds de vorige uitgave is een aantal producten beschikbaar gekomen:

- Glucient SR<sup>®</sup>, een tablet met gereguleerde afgifte met de bloedglucoseverlager metformine.
- Juluca<sup>®</sup>, een tablet met dolutegravir en rilpivirine die wordt toegepast bij HIV-infectie.
- Saxenda<sup>®</sup>, een subcutane injectie met liraglutide die wordt toegepast bij obesitas en overgewicht.
- Skilarence<sup>®</sup>, een maagsapresistente tablet met dimethylfumaraat die wordt toegepast bij psoriasis.
- Softacor<sup>®</sup>, oogdruppels voor eenmalig gebruik met hydrocortison.

### CBG-nieuwsberichten

Kortgeleden zijn de volgende waarschuwingen van het CBG uitgekomen die zijn verwerkt:

- Azitromycine: toepassing bij patiënten die vanwege een hematologische maligniteit een hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) hebben ondergaan is gecontraïndiceerd, vanwege een verhoogd risico op recidief hematologische maligniteiten en mortaliteit.
- Denosumab: bij behandeling met Xgeva<sup>®</sup> bij uitgezaaide botkanker of een reusceltumor van het bot, kan er opnieuw kanker optreden.
- Dolutegravir: gebruik is gecontraïndiceerd tijdens de zwangerschap en bij kinderwens vanwege een verhoogd risico op neuralebuisdefecten bij het ongeboren kind.
- Olaparib: de aanbevolen dosering bij de Lynparza<sup>®</sup> capsules of tabletten is verschillend. Bij wisselen van vorm (tablet naar capsule of andersom) bestaat zo het risico dat patiënten te veel of juist te weinig olaparib krijgen.

### Gewijzigde behandelrichtlijnen

De herziene NHG-Standaarden Allergische en niet-allergische rinitis, Beroerte en Pijn zijn verwerkt. Verder zijn de richtlijn Uitvoering RVP 2018, addendum 19: MenACWY-vaccinatie voor kinderen op de leeftijd van 14 maanden en de LCI-richtlijn Meningokokken ACWY-vaccinatie verwerkt, zie ook het [KNMP-nieuwsbericht](#).

### Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard

- rubriek Verminderde nierfunctie: algeldraat, aluminiumhydroxidemagnesiumcarbonaat, ceftaroline, eptifibatide, fluconazol, flucytosine, hydrotalciet, lithiumcarbonaat, memantine, miglustat, penicillamine, sucralfaat, telbivudine, tirofiban en valproïnezuur.
- Interactie met grapefruitsap: guanfacine, naloxegol, olaparib, palbociclib en ruxolitinib.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail [gic@knmp.nl](mailto:gic@knmp.nl).

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum