

IM-UPDATE



Geachte collega,

Het Informatorium wordt elke 2 weken geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank van mei 2020. De inhoud van de uitgave van 1 mei is op 30 april afgerond. Het betreft wijzigingen ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 april 2020.

CBG-nieuwsberichten

Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met waarschuwingen voor het gebruik van cyproteron en voor (hydroxy)chloroquine. Bij gebruik van cyproteron in een hoge dosering (25 mg per dag of meer) is het risico op een meningeoom verhoogd. Bij gebruik van (hydroxy)chloroquine bij COVID-19 is er een risico op ernstige hartritme stoornissen.

COVID-19

De stofteksten van chloroquine en hydroxychloroquine zijn uitgebreid met aanvullende informatie over doseringen, contra-indicaties, interacties en gebruik in geval van verminderde nierfunctie bij de experimentele behandeling van matig ernstig en zeer ernstig COVID-19 door het coronavirus SARS-CoV-2. De stoftekst van remdesivir is uitgebreid met informatie van de EMA. Voor uitgebreide en recente informatie over COVID-19 verwijzen wij u naar het [KNMP-bestand Vragen en antwoorden over het coronavirus](#).

Dosering adrenaline bij neonaten

Van 1 maart tot en met 22 april 2020 was de dosering van adrenaline bij cardiopulmonale resuscitatie bij neonaten op basis van het kinderformularium niet correct weergegeven. De dosering moet zijn: *"neonaten intraveneus 0.01 mg/kg lich.gewicht, daarna zo nodig 0.01-0.03 mg/kg lich.gewicht, elke 1-3 min herhalen"*. Sinds 23 april staat deze dosering correct in het Informatorium vermeld.

Herziening Antivirale middelen bij HIV-infectie

De inleidende tekst van de Antivirale middelen bij HIV-infectie is bijgewerkt aan de hand van de Richtlijn HIV van de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren. Dit heeft geleid tot aanpassingen in met name de rubrieken Toepassing, Zwangerschap en Bijzonderheden. De rubriek Zwangerschap is ook bij alle stoffen bijgewerkt.

De Richtlijn HIV verwijst in veel gevallen naar de Amerikaanse richtlijn 'Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV' van de 'U.S. Department of Health and Human Services'.

Andere Nederlandse en Internationale richtlijnen die zijn gebruikt voor de actualisering van het hoofdstuk zijn:

- LCI-richtlijn HIV-infectie
- LCI-richtlijn Prikaccidenten
- HIV expositieprotocol neonaten van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);
- HIV Pre-expositie profylaxe (PrEP) richtlijn Nederland
- 'Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection'
- 'Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs in Pregnant Women with HIV Infection and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States'
- 'European Aids Clinical Society (EACS)' richtlijnen
- 'Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV'

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail gic@knmp.nl.

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum