

Geachte collega,

Het Informatorium wordt elke 2 weken geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank van november 2019. De inhoud van de uitgave van 1 november is op 31 oktober afgerond. Het betreft wijzigingen ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 oktober 2019.

## **Nieuwe producten**

Sinds de vorige uitgave is een aantal producten met een nieuwe farmaceutische vorm, een nieuwe combinatie of een nieuw werkzaam bestanddeel beschikbaar gekomen:

- Caddera<sup>®</sup>, een infusievloeistof met calciumchloride voor calciumsubstitutie bij nierfunctievervangende therapie met citraatantistolling.
- Dectova<sup>®</sup>, een infusievloeistof met zanamivir voor de behandeling van ernstige influenza A- of B- virusinfecties.
- Itulazax<sup>®</sup>, een smelttablet voor sublinguale immunotherapie van door berkenpollen veroorzaakte allergische rinitis en conjunctivitis.
- LysaKare<sup>®</sup>, een infusievloeistof met arginine en lysine voor vermindering van de renale blootstelling aan straling tijdens radiotherapie met Lutetium Lu-177 oxodotreotide.
- Mysimba<sup>®</sup>, een tablet met naltrexon en bupropion voor obesitas en overgewicht.

## **CBG-nieuwsberichten**

Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met waarschuwingen voor het gebruik van fingolimod en ingenolmebutaat. De volgende waarschuwingen zijn verwerkt.

- fingolimod (Gilenya<sup>®</sup>), gebruik tijdens de zwangerschap en bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd die geen anticonceptie gebruiken is gecontraïndiceerd vanwege een verdubbeling van het risico op aangeboren afwijkingen;
- ingenolmebutaat (Picato<sup>®</sup>), het risico op huidkanker is mogelijk verhoogd.

## **Herziening van hoofdstukken**

- Antivirale middelen bij herpesinfecties; dit hoofdstuk is volledig herzien aan de hand van SmPC's, de betreffende LCI-richtlijnen en NHG-Behandelrichtlijnen. Bij herpes simplex-virusinfecties en varicella zoster-virusinfecties worden vooral aciclovir, famciclovir en valaciclovir toegepast. Bij cytomegalo-virusinfecties worden vooral cidofovir, foscarnet, ganciclovir, letermovir en valganciclovir toegepast.
- Prolactineremmers: het hoofdstuk is volledig herzien aan de hand van de NVOG-richtlijn Anovulatie en Kinderwens, de NHG-Standaard Amenorroe, SmPC's en literatuur. In het hoofdstuk zijn opgenomen de ergotalkaloïden bromocriptine en cabergoline en het niet-ergotalkaloïd quinagolide. Deze middelen worden onder andere toegepast bij hyperprolactinemie en voor het voorkomen en onderdrukken van de lactatie.

## **Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard**

- rubriek Verminderde nierfunctie: amikacine, amoxicilline (+clavulaanzuur), anakinra, atovaquon, baricitinib, brexpiprazol, ceftaroline, ceftazidim, ceftibuten, ciprofloxacine, claritromycine, colistine, dalbavancine, entecavir, ethambutol, flucloxacilline, fosfomycine, gabapentine, gentamicine, levetiracetam, posaconazol, proguanil en pyrazinamide.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail [gic@knmp.nl](mailto:gic@knmp.nl).

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum