

# IM-UPDATE



Geachte collega,

Het Informatorium wordt vanaf 7 oktober 2020 dagelijks geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank ten opzichte van de laatste uitgave op de KNMP Kennisbank van 14 juli 2020.

## Nieuwe stoffen

Sinds de vorige uitgave zijn 10 nieuwe stofmonografieën opgenomen.

- Alpelisib, een oncolyticum dat in combinatie met fulvestrant wordt toegepast bij HER2-negatief mammacarcinoom met een PIK3CA-mutatie bij postmenopauzale vrouwen en mannen.
- Cefepim, een cefalosporine dat intraveneus wordt toegepast bij ernstige infecties. Cefepim is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium.
- Doxylamine, een antihistaminicum dat wordt toegepast bij misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap in een combinatiepreparaat met pyridoxine (Xonvea®). Doxylamine is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium.
- Entrectinib, een oncolyticum voor behandeling van solide tumoren met een neurotrofe-tyrosinereceptorkinase (NTRK)-genfusie en van niet-kleincellig longcarcinoom.
- Isatuximab, een oncolyticum dat in combinatie met pomalidomide en dexamethason wordt toegepast bij multipel myeloom.
- Fluocinolonacetonide, een corticosteroïd dat intravitreaal wordt toegepast bij diabetisch macula-oedeem en niet-infectieuze uveïtis. Het is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium.
- Moederkruid, een traditioneel kruidengeneesmiddel ter voorkoming van migraine-hoofdpijn.
- Onasemnogeen abeparvovec, een gentransfervector van de adenogeassocieerde virale vector serotype 9 (AAV9) dat intraveneus wordt toegepast bij spinale musculaire atrofie 5q.
- Polatuzumab vedotine, een oncolyticum dat in combinatie met bendamustine en rituximab wordt toegepast bij diffuus grootcellig B-cellymfoom.
- Teduglutide, een recombinant-analoon van het humane glucagon-like peptide-2 (GLP-2) dat wordt toegepast bij het kortedarmsyndroom. Het is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium.

## Herziening Antipsychotica

Het hoofdstuk Antipsychotica met in totaal 24 geneesmiddelen is in zijn geheel herzien. Antipsychotica worden in verschillende bronnen nog onderverdeeld in klassieke en atypische antipsychotica, maar in de praktijk wordt dit onderscheid weinig meer gehanteerd.

Bij de herziening is gebruikgemaakt van verschillende multidisciplinaire richtlijnen, zoals de richtlijnen Schizofrenie, Bipolaire stoornis en Depressie. Daarnaast zijn verschillende richtlijnen van het Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie en Palliatieve geraadpleegd.

Mevr. drs. I. Liefding-Kluft, als apotheker verbonden aan Apotheek Parnassia Groep te Den Haag, heeft het hoofdstuk van commentaar voorzien, waarvoor hartelijk dank.

## Gewijzigde behandelrichtlijnen

In juli 2020 is de NHG-Standaard Astma bij volwassenen herzien. De relevante wijzigingen met betrekking tot het medicamenteuze beleid zijn verwerkt in de hoofdstukken Corticosteroïden voor gebruik per inhalatie en Sympathicomimetica met vooral  $\beta_2$ -effect, en in de verschillende stofteksten. De belangrijkste wijzigingen in de Standaard zijn:

- Stap 1 in de medicamenteuze behandeling is nog altijd monotherapie met een kortwerkend  $\beta_2$ -sympathicomimetikum, maar deze stap wordt veelal overgeslagen. Deze stap is alleen geïndiceerd bij zeer weinig frequente klachten (minder dan 2x per week overdag).
- Formoterol in combinatie met een inhalatiecorticosteroïd is een alternatief voor het kortwerkend  $\beta_2$ -sympathicomimetikum als 'zo nodig' behandeling.
- De dosering van de inhalatiecorticosteroïden is onderverdeeld in lage, intermediaire en hoge dosering. De overzichtstabel met de indeling per inhalatiecorticosteroïd is terug te vinden in de NHG-Standaard.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail [gic@knmp.nl](mailto:gic@knmp.nl).

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum