

Alternatieven voor pancuronium (Pavulon®)

| Generiek | Specialité | Dosis | Bijzonderheden | Handelsproduct | Halfwaardetijd |
|---------------|------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Atracurium | Tracurium® | 2 ampullen van 50 mg (10 mg/ml – 5 ml) | 50 mg = 5 ml | Atracurium Halen Injectievloeistof Tracurium | 20 min |
| Cisatracurium | Nimbex® | 3 ampullen van 10 mg (2 mg/ml – 5ml) | 10 mg = 5 ml | Nimbex | 22-29 min |
| Rocuronium | Esmeron® | 3 ampullen van 50 mg (10 mg/ml – 5 ml) | 50 mg = 5 ml | Esmeron | 73 min |

Vergoeding

Alle spierrelaxantia worden vergoed.

Eerste keus middel

In de Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding is rocuronium het middel van eerste keus. Atracurium en cisatracurium zijn goede alternatieven en kunnen ook worden gebruikt.

Niet geadviseerde spierrelaxantia

Mivacurium wordt niet geadviseerd vanwege zijn korte halfwaardetijd.

Vecuronium wordt niet geadviseerd omdat deze eerst moet worden opgelost. Dit is een extra handeling in vergelijking met de andere spierrelaxantia.