Visualisatie farmaceutische medicatie-evaluaties door de apotheker

Op initiatief van: patiënt of diens mantelzorger; apotheker; arts, andere collega-zorgverlener of samenwerkingsverband

Doel: het inzetten van passende medicatie-evaluaties bij wisselende zorgvragen van de patiënt in elke fase van de farmacotherapeutische behandeling t.b.v. continuïteit van zorg en goed en veilig medicatiegebruik.

Incidentele zorgvraag	Zorgvraag bij chronische aandoening	
	Startfase	Vervolgfase
Consult **Voorbeelden:** • Bij zelfzorg • Bij receptgeneesmiddel	**Consult bij het starten van een geneesmiddel** **Voorbeelden:** • Eerste uitgiftebegeleiding • Tweede uitgiftebegeleiding • Vervolgconsult t.b.v. aanvullende begeleiding bij knelpunten of voor monitoring	**Consult bij het vervolgen van een geneesmiddel** **Voorbeelden:** • Vervolgconsult t.b.v. aanvullende begeleiding bij knelpunten of voor monitoring/follow-up • Jaargesprek
Farmacotherapeutische analyse **Voorbeelden:** • Signaleren (risico's op) knelpunten • Beoordelen of (zelfzorg)medicatie veilig en passend gestart kan worden	**Farmacotherapeutische analyse bij het starten van een geneesmiddel** **Voorbeeld:** • Beoordelen medicijnrol bij het starten van nieuwe medicatie	**Farmacotherapeutische analyse bij het vervolgen van een geneesmiddel** **Voorbeelden:** • (Periodieke) analyse medicijnrol • Analyse herhaalmedicatie • Proactieve screening op suboptimale medicatie

Medicatiebeoordeling (MBO)
Een MBO is een intensieve vorm van medicatie-evaluatie die o.a. zowel consulten als een uitgebreide farmacotherapeutische analyse omvat.

Specifieke situaties waarin medicatie-evaluaties kunnen worden toegepast

Voorbeelden:
- Wijzigen, minderen en/of stoppen van medicatie
- Farmaceutische zorg bij opname in en/of ontslag (heropname in de eerste lijn) uit het ziekenhuis of een andere zorginstelling
- Wisselen van medicatie (bijv. bij geneesmiddelentekorten of opioïdrotatie)
- Farmaceutische zorg tijdens de palliatiatieve fase

Toelichting:

- *Medicatie-evaluatie is een consult, een farmacotherapeutische analyse of een MBO.*
- *Een farmacotherapeutische analyse kan los van een consult worden uitgevoerd, gericht op een specifieke situatie ter signalering en voorkoming van farmacotherapeutische problemen.*
- *De fasen van geneesmiddelgebruik (incidenteel, start- en vervolgfase chronisch gebruik) zijn dynamisch; patiënten kunnen zich tussen deze fasen bewegen en één of meerdere zorgvragen hebben.*