

IM-UPDATE



December 2023

Geachte collega,

Het Informatorium wordt dagelijks geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank in de maand november.

Nieuwe stoffen

Er zijn 2 nieuwe stofmonografieën opgenomen.

- Eptacog beta, geactiveerd: een stollingsfactor die wordt toegepast voor behandeling en profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie A of B met antistoffen ('remmers') tegen factor VIII respectievelijk factor IX.
- Tinidazol: een antiprotozoïcum dat wordt toegepast bij gastro-enteritis veroorzaakt door infectie met *Giardia lamblia* (giardiasis). Het is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium.

Zwangerschapspreventieprogramma topiramaat

De informatie in de zwangerschapsrubriek van topiramaat is aangepast. Bij gebruik tijdens de zwangerschap kunnen ernstige aangeboren afwijkingen, groeibeperkingen en neurologische ontwikkelingsstoornissen optreden bij het ongeborn kind. Er is daarom een zwangerschapspreventieprogramma van kracht. Bij vrouwen die zwanger kunnen worden, mag topiramaat alleen worden toegepast als aan de voorwaarden van het zwangerschapspreventieprogramma wordt voldaan. Enkele voorwaarden zijn adequate anticonceptie gedurende de gehele duur van de behandeling en ten minste 4 weken daarna, en uitsluiting van zwangerschap met een zwangerschapstest voorafgaand aan de behandeling.

Herziening hoofdstukken

De subgroep Opioiden, die valt onder het hoofdstuk Analgetica, is volledig herzien. Tot deze groep behoren 16 stoffen. Deze middelen worden vooral toegepast bij pijn, bijvoorbeeld acute pijn (zoals buikpijn, pijn bij acuut coronair syndroom, en pijn bij fracturen en trauma's), chronische pijn, neuropathische pijn, pijn bij kanker al dan niet in de palliatieve fase, pijn tijdens en na een operatieve ingreep en pijn tijdens weeën en bevalling. Morfine, fentanyl en oxycodon worden bovendien toegepast bij dyspneu in de palliatieve fase.

De NHG-Standaard Pijn is onlangs herzien. Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

- Oxycodon en buprenorfine zijn toegevoegd als voorkeursmiddelen binnen de sterk werkende opioïden bij acute pijn.
- Alle opioïden geven een risico op verslaving. Er lijkt geen verschil te zijn in het risico op verslaving tussen de verschillende opioïden, inclusief oxycodon. Oxycodon is een aantal keren in het nieuws geweest vanwege rechtszaken die waren aangespannen omdat de verslavende effecten van dit middel werden gebagatelliseerd.

Bij de herziening van de subgroep Opioiden is onder andere gebruik gemaakt van de NHG-Standaard Pijn, de NVA-richtlijnen Pijn bij patiënten met kanker, Postoperatieve pijn en Pijnbehandeling tijdens de bevalling, de IKNL-richtlijnen Ileus in de palliatieve fase en Dyspneu in de palliatieve fase, en de MDR Pijn bij kwetsbare ouderen van Verenso.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail gic@knmp.nl.

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum