

IM-Update

Mei 2025

Geachte collega,

Het Informatorium wordt dagelijks geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank in de maand april.

Nieuwe stoffen

Er zijn 5 nieuwe stofmonografieën opgenomen.

- Efanesoctocog alfa, een stollingsfactor die intraveneus wordt toegepast voor behandeling en profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie A.
- Eplontersen, een antisense-oligonucleotide gericht tegen transthyretine (TTR) dat subcutaan wordt toegepast bij erfelijke transthyretine-gemedieerde amyloïdose (ATTRv) met polyneuropathie in stadium 1 of stadium 2.
- Garadacimab, een humaan IgG4 recombinant monoklonaal antilichaam dat subcutaan wordt toegepast voor preventie van aanvallen van hereditair angio-oedeem (HAE).
- Pegunigalsidase alfa, een gepegyleerde recombinante vorm van humaan α -galactosidase-A die intraveneus wordt toegepast bij ziekte van Fabry (α -galactosidase deficiëntie).
- Quizartinib, een oncolyticum en tyrosinekinaseremmer die oraal wordt toegepast bij acute myeloïde leukemie (AML) die positief is voor FLT3-ITD, als inductiebehandeling in combinatie met cytarabine en een antracycline, en als consolidatiebehandeling met cytarabine, gevolgd door onderhoudsbehandeling als monotherapie.

Herziening van hoofdstukken

De subgroepen Oestrogenen en Progestagenen van het hoofdstuk Geslachtshormonen zijn volledig herzien.

- Oestrogenen worden vooral toegepast als oestrogeensuppletie therapie tijdens de overgang, en bij puberteitsinductie bij primaire amenorroe (zoals bij het syndroom van Turner). In combinatie met progestagenen worden ze ook voor hormonale anticonceptie toegepast.
- Progestagenen worden onder andere toegepast bij hevig menstrueel bloedverlies, uitstel van de menstruatie, vroeggeboorte of miskraam, en als adjuvans bij oestrogeensuppletie therapie. Ook kunnen ze als noodanticonceptie worden ingezet, en zonder oestrogenen worden gebruikt als hormonaal anticonceptivum (minipil, implantaat, hormoonspiraal en prikpil).

De herziening is gebaseerd op literatuur over de middelen, en voor de praktijk belangrijke richtlijnen en standaarden, zoals de NHG-Standaarden Overgang, Amenorroe en Vaginaal bloedverlies, de NHG-Behandelrichtlijn Menstruatie-uitstel, en de NVOG-richtlijnen Hevig menstrueel bloedverlies, Primaire amenorroe, Preventie vroeggeboorte en Herhaalde miskraam.

Gewijzigde verkeersdeelname-adviezen Benzodiazepineagonisten en TCA's

De verkeersdeelname-adviezen voor de Benzodiazepineagonisten en TCA's zijn kortgeleden herzien; dit zijn er 26 in totaal. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- De herindeling van clobazam, clorazepinezuur en prazepam van categorie II naar categorie III.
- Aanpassing van de adviezen voor amitriptyline, dosulepine en doxepine op basis van de dagdosering.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail gic@knmp.nl.

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum