

IM-Update

Juni 2025

Geachte collega,

Het Informatorium wordt dagelijks geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank in de maand mei.

Nieuwe stoffen

Er zijn 5 nieuwe stofmonografieën opgenomen.

- Etrasimod, een sfingosine-1-fosfaat-receptormodulator die oraal wordt toegepast bij matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa waarbij andere middelen geen of onvoldoende effect hebben of niet kunnen worden toegepast.
- Insuline icodec, een ultralangwerkend insuline dat eenmaal per week subcutaan wordt toegepast bij diabetes mellitus.
- Lecanemab, een IgG1 monoklonaal antilichaam dat intraveneus wordt toegepast bij milde cognitieve beperkingen en dementie als gevolg van de ziekte van Alzheimer met bevestigde amyloïde pathologie bij patiënten die geen drager zijn of heterozygoot zijn voor het ApoE ε4-gen.
- Marstacimab, een hemostaticum en IgG1 monoklonaal antilichaam gericht tegen het Kunitz-domein 2 (K2) van de 'tissue factor pathway inhibitor' (TFPI) dat subcutaan wordt toegepast voor profylaxe van bloedingen bij patiënten met ernstige hemofilie A zonder antistoffen ('remmers') tegen factor VIII, of met ernstige hemofilie B zonder antistoffen tegen factor IX.
- Rezafungine, een antimycoticum uit de groep van de Echinocandinen dat intraveneus wordt toegepast bij invasieve candidiasis.

Herziening van hoofdstukken

De subgroep Carbapenems van het hoofdstuk Antibacteriële middelen, en de subgroep Sfingosine-1-fosfaat-receptormodulatoren van het hoofdstuk Immunomodulantia zijn volledig herzien.

- Carbapenems (ertapenem, imipenem en meropenem) zijn betalactam-antibiotica met een breed werkingsspectrum. Ze worden onder andere toegepast bij meningitis en sepsis.
Imipenem wordt alleen in combinatie met cilastatine gebruikt, en zo nodig ook nog met de betalactamaseremmer relebactam.
Meropenem wordt als monotherapie of in combinatie met de betalactamaseremmer vaborbactam gebruikt.
- Sfingosine-1-fosfaat-receptormodulatoren (etrasimod, fingolimod, ozanimod, ponesimod en siponimod) worden vooral oraal toegepast bij verschillende vormen van multipale sclerose.
Ozanimod wordt ook toegepast bij colitis ulcerosa. Het nieuwe middel etrasimod wordt alleen toegepast bij colitis ulcerosa.
Bij deze middelen zijn aan het begin van de behandeling veel voorzorgen nodig vanwege het risico op bradycardie.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail gic@knmp.nl.

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum