

IM-Update

December 2025

Geachte collega,

Het Informatorium wordt dagelijks geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank in de maand november.

Nieuwe stoffen

Er zijn 2 nieuwe stofmonografieën opgenomen.

- Elranatamab, een oncolyticum voor recidiverend en refractair multipel myeloom (MM) dat is behandeld met ten minste 3 andere behandelingen, waaronder een immunomodulerend middel, een proteasoomremmer en een CD38-revendend monoklonaal antilichaam, en waarbij ziekteprogressie optrad, als monotherapie.
- Retifanlimab, een oncolyticum voor eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd of recidiverend lokaal gevorderd Merkelcelcarcinoom (MCC) dat niet in aanmerking komt voor curatieve resectie of bestraling, als monotherapie.

Herziening van hoofdstukken

De groep Anthelminthica is volledig herzien.

Anthelminthica zijn middelen die bij de mens parasitaire wormen bestrijden. De groep bestaat uit albendazol, ivermectine, mebendazol, niclosamide en praziquantel.

In Nederland zijn de meest voorkomende worminfecties met hun behandeling:

- enterobiasis (veroorzaakt door de aarsmade Enterobius vermicularis): mebendazol of albendazol;
- ascariasis (veroorzaakt door de spoelworm Ascaris lumbricoïdes): bij voorkeur mebendazol of als alternatief albendazol;
- trichuriasis (veroorzaakt door de zweepworm Trichuris trichiura): eerste keus mebendazol, tweede keus albendazol of als alternatief ivermectine;
- taeniasis (veroorzaakt door de lintworm Taenia saginata): eerste keus niclosamide of als alternatief praziquantel.

Pneumokokkenvaccin

In het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) is op advies van de Gezondheidsraad het polysaccharidevaccin PPV23 (Pneumovax 23[®]) vervangen door het conjugaatvaccin PCV20 (Prevenar 20[®]) en is de doelgroep uitgebreid naar alle personen van 60 jaar en ouder. Deze wijziging in het NPPV is verwerkt in de stofmonografie van Pneumokokkenvaccin.

De indicaties voor een vaccinatie met PCV20 binnen het NPPV zijn: 60-jarigen, inclusief personen die in het jaar van vaccineren 60 jaar worden (primaire doelgroep), personen ouder dan 60 jaar die 5 jaar eerder een vaccinatie met PPV23 hebben ontvangen, en personen van 85 jaar en ouder (geboren voor 1941) die niet eerder gevaccineerd zijn binnen het NPPV omdat zij niet in aanmerking kwamen.

De beschermingsduur van PCV20 is langer dan die van PPV23. PCV20 hoeft daarom voorlopig maar één keer gegeven te worden en niet elke 5 jaar zoals bij PPV23 het geval is.

Gewijzigde behandelrichtlijnen

De afgelopen maanden zijn de volgende herziene (behandel)richtlijnen verwerkt.

- NHG-Standaarden Angst, Obesitas, en Zwangerschap en kraamperiode
- NVN-richtlijn Myositis
- NVR-richtlijnen Jicht in de 2e lijn, Reuscelarteriitis en Systemische Lupus erythematodes (SLE)
- NVDV-richtlijnen Alopecia areata en Constitutioneel eczeem
- NVU-richtlijn Urine-incontinentie (UI) 2e- en 3e-lijnszorg
- NVVH-richtlijn Proctologie

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail gic@knmp.nl.

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum