KNMP | Apothekersorganisatie

IM-Update

Augustus 2026

Geachte collega,

Het Informatorium wordt dagelijks geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank in de maand juli 2026.

Nieuwe stoffen

Er zijn 5 nieuwe stofmonografieën opgenomen.

- Clascoteron, een androgeenreceptorremmer die in een crème op de huid wordt toegepast bij acne vulgaris.
- Echinacea/Salie, een stofcombinatie van echinacea en salie die wordt toegepast als traditioneel kruidengeneesmiddel bij (beginnende) keelpijn en bij irritatie van het slijmvlies van de mond en keel, in de vorm van een oromucosale spray of zuigtablet.
- Natriumfluoride F-18, een radiofarmacon voor functionele beeldvormingsprocedures voor onderzoek van ongewone veranderingen in osteogene activiteit.
- Repotrectinib, een oncolyticum en tyrosinekinaseremmer die oraal wordt toegepast bij ROS1-positief gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom en NTRK-genfusie-positieve solide tumoren.
- Tremelimumab, een oncolyticum dat intraveneus wordt toegepast voor eerstelijnsbehandeling van gevorderd of niet-reseceerbaar hepatocellulair carcinoom (HCC) en gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), in combinatietherapie.

Herziening van hoofdstukken

Het hoofdstuk Antimycotica is volledig herzien. De groep is als volgt ingedeeld:

- Antimycotische antibiotica
- Echinocandinen
- Imidazoolderivaten
- Triazoolderivaten
- Overige antimycotica

Daarnaast zijn de combinatiepreparaten in een afzonderlijke groep opgenomen; deze worden toegepast bij dermatomycosen.
Antimycotica worden voornamelijk toegepast voor profylaxe en behandeling van systemische of lokale mycosen. Belangrijke behandelrichtlijnen die zijn gebruikt voor de herziening zijn de NHG-Standaarden Dermatomycosen en Fluor vaginalis, en de SWAB-richtlijn Invasieve schimmelinfecties. Ook is informatie verwerkt uit het Nationale AntibioticaBoekje van de SWAB.

Chikungunya-vaccin

De stofmonografie van Chikungunya-vaccin is volledig herzien op basis van de SmPC's, het LCR-protocol Chikungunya, de LCI-richtlijn Chikungunya en de LCI-factsheet Chikungunyavaccinatie.
Er zijn twee chikungunya-vaccins in de handel: Vimkunya®, een 'virus-like particles' (VLP) vaccin en Ixchiq®, een levend verzwakt vaccin. Vaccinatie wordt aanbevolen voor reizigers naar gebieden waar een uitbraak van het chikungunyavirus is. Het LCR geeft de voorkeur aan vaccinatie met het niet-levende ('virus-like particles') vaccin. De indicatie van het levend verzwakte chikungunya-vaccin is ingeperkt vanwege het risico op ernstige bijwerkingen. Verder is het levend verzwakte vaccin gecontraïndiceerd bij immuungecompromitteerden.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail gic@knmp.nl.

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum